

Ficha Técnica de recomendaciones de uso

COOPER MIX

COOPER MIX es un fungicida que puede aplicarse de manera preventiva antes de que se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Además está especialmente diseñado para suplir funciones principales de Cobre en la planta, en el campo de las enzimas oxidasas, ácido ascórbico, polifenol, citocromo, entre otras esenciales. También parte de la plastocianina contenida en los cloroplastos y que participa en la cadena de transferencia de electrones de la fotosíntesis. La absorción de este producto se realiza mediante un proceso activo metabólicamente.

Composición Porcentual

Ingrediente activo
 Sulfato de cobre pentahidratado 29.00%

Ingredientes inertes
 Quelatantes 02.00%
 Diluyentes y dispersantes 69.00%



Estado físico: Líquido.

Presentación de 20 L.

Cultivo	Plaga	Dosis	Número de aplicaciones
Jitomate Papa Aguacate Chile	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>). Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>). Bacteriosis (<i>Pseudomonas syringae</i>). Moho de la hoja (<i>Cladosporium fulvum</i>).	2 L/ha.	Se aplica durante la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.
Frijol (SI) Arándano	Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>).	2 L/ha.	Se aplica durante la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, o aplicar de manera programada para prevenir.
Soya (SI)	Antracnosis (<i>Colletotrichum sp.</i>). Manchas de ojo rana (<i>Cercospora sojina</i>). Mildiu (<i>Peronospora sp.</i>).	2 L/ha.	Se aplica al formarse las primeras vainas, se repite la aplicación dos veces cada 15 días.
Manzano Peral Zarzamora	Tizón de fuego (<i>Erwinia amylovora</i>). Pudrición amarga (<i>Glomerella cingulata</i>).	3 L/ha.	Se aplica durante la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, o aplicar de manera programada para prevenir.
Melón Pepino Sandía Frambuesa Berry	Antracnosis (<i>Colletotrichum lagenarium</i>). Mancha de la hoja (<i>Alternaria cucumerina</i>). Mildiu (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>). Cenicilla (<i>Erysiphe cichoracearum</i>).	2 L/ha.	Se aplica durante la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o también de manera preventiva cada 15 días.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Por su formulación líquida puede aplicarse de forma foliar, riego por goteo, riego por aspersión además por fertirrigación por riego rodado.
- Se recomienda diluya en las dosis indicadas en el recipiente previo con agua.
- Agite antes de proceder a la aplicación.
- No mezcle con cobre, dimetoato, aceites, nitrato de potasio y productos de fuerte reacción alcalina.
- Se recomienda realizar una prueba antes de mezclar y consultar a personal técnicamente autorizado.

